

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1.3.1 | Florfenicol |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI |

NAVODILO ZA UPORABO

Floron 2 g/100 g predmešanica za zdravilno krmno mešanico za prašiče in ribe

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

KRKA, tovarna zdravil, d. d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Floron 2 g/100 g predmešanica za zdravilno krmno mešanico za prašiče in ribe
Florfenikol

3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

100 g predmešanice za zdravilno krmno mešanico vsebuje 2 g florfenikola.

4. INDIKACIJE

Prašiči: plevropnevmonija (*Actinobacillus pleuropneumoniae*), atrofični rinitis (*Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*), Glässerjeva bolezen (*Haemophilus parasuis*) in ostale bolezni, ki jih povzročajo za florfenikol občutljivi mikroorganizmi.

Ribe: furunkuloza (*A. salmonicida* subsp. *salmonicida*) in ostale aeromonasne infekcije, vibrioza (*Vibrio* sp.), pastereloza (*Pasteurella piscicida*) in ostale bolezni, ki jih povzročajo za florfenikol občutljivi mikroorganizmi.

5. KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

6. NEŽELENI UČINKI

Pri prašičih se lahko pojavi pordelost perianalnega področja in mehko blato. Spremembe so prehodne in kratkotrajne ter ne vplivajo na splošno počutje živali.

Pri ribah niso znani.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči, ribe

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1.3.1 | Florfenicol |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI |

Prašiči: Dnevni odmerek je 10 mg florfenikola na kg telesne mase. V krmo zamešamo 10 kg Florona na tono krme, kar pomeni 200 g florfenikola na tono krme. Zdravljenje traja 5 dni.

Ribe: Dnevni odmerek je 10 mg florfenikola na kg telesne mase. V krmo vmešamo 50 g Florona na 100 kg telesne mase rib. Zdravljenje traja 10 dni. Zarodu in mladitvam razdelimo dnevni odmerek zdravila na dva enaka dela.

Floron se v krmo/krmno mešanico vmešava samo v obratih, ki so odobreni za proizvodnjo medicirane krme.

Za dobro homogenost mešanja lahko uporabimo priročni mešalec. Najprej zamešamo do 25 kg pelet in ustrezno količino Florona (glej tabelo). Nato med mešanjem postopno dodajamo 1 liter jedilnega ali ribjega olja, ki veže zdravilo na pelete. Mešanje je končano, ko pelete enakomerno potemni.

Količina krme, ki jo ribe pojedjo, je odvisna od temperature vode in zdravstvenega stanja rib. Ponavadi jo pojedjo 0,5 do 3 % telesne mase na dan.

Za zdravljenje krapov zdravilo najprej vmešamo v nepoletirano krmo in nato pripravimo obrok v obliki testa, ki ga dajemo v krmilnike.

Tabela za pripravo medicirane krme za ribe

| Intenzivnost krmljenja (glede na telesno maso rib) | Količina pelet | Količina Florona | Medicirana krma zadostuje za dnevno zdravljenje |
|---|-------------------|---------------------|--|
| 0,5 % (0,5 kg krme/100 kg rib) | 25 kg | 2,5 kg | 5000 kg rib |
| 1 % (1 kg krme/100 kg rib) | 25 kg | 1,250 kg | 2500 kg rib |
| 1,5 % (1,5 kg krme/100 kg rib) | 25 kg | 0,833 kg | 1666 kg rib |
| 2 % (2 kg krme/100 kg rib) | 25 kg | 0,625 kg | 1250 kg rib |
| 3 % (3 kg krme/100 kg rib) | 25 kg | 0,417 kg | 833 kg rib |

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

Zdravila ne smemo uporabljati sočasno s tiamfenikolom ali kloramfenikolom.

10. KARENCA

Meso in organi prašičev: 20 dni.

Ribe: 80°D (dnevni stopinj).

Ribe niso primerne za prehrano ljudi najmanj 16 dni pri temperaturi vode med 5 °C in 10 °C ali 8 dni pri temperaturi vode nad 10 °C.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte v originalnem pakiranju pri temperaturi do 30 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

12. POSEBNA OPOZORILA

Prašiči: Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije pri svinjah. Ne uporabite pri odraslih merjascih, ki so namenjeni za reprodukcijo.

Ribe: Zdravila ne dajemo ribam, kadar je temperatura vode nižja od 5 °C.

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1.3.1 | Florfenicol |
| SPC, Labeling and Package Leaflet | SI |

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO

17.08.2012

15. DRUGE INFORMACIJE

Vrečke po 100 g in 1 kg
Lončki po 100 g in 1 kg
Vreče po 10 kg

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.