

## NAVODILO ZA UPORABO

FLORON 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

### 1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
8501 Novo mesto  
Slovenija

### 2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FLORON 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče  
Florfenikol

### 3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

Florfenikol..... 300 mg/ml

### 4. INDIKACIJE

Zdravljenje bolezni, katerih povzročitelji so občutljivi na florfenikol.

#### Govedo:

- Infekcije dihal, ki jih povzročajo *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* in *Haemophilus somnus*,
- interdigitalna nekrobaciloza (*Fusobacterium necrophorum* in *Bacteroides melaninogenicus*) ter
- infekcijski keratokonjunktivitis (*Moraxella bovis*).

Prašiči: Bolezni dihal, ki jih povzročajo *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus parasuis*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Mycoplasma hyorhinitis*, *Salmonella enterica* in *Streptococcus suis*.

### 5. KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije ter pri odraslih bikih in merjascih, ki so namenjeni za reprodukcijo.

### 6. NEŽELENI UČINKI

Govedo: Med zdravljenjem se lahko pojavi zmanjšan apetit, zmanjšano pitje vode in diareja. Živalim se hitro in popolnoma povrne apetit takoj po prenehanju zdravljenja. Na mestu dajanja se redko pojavijo spremembe v obliki rahle otekline. Spremembe izginejo najkasneje po 28 dneh.

Prašiči: Lahko se pojavi pordelost in/ali otekline perianalnega tkiva in/ali diareja. Na mestu dajanja se zelo redko pojavi reakcija v obliki otekline. Spremembe na mestu dajanja so kratkotrajne in popolnoma izginejo najkasneje v 3 tednih.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

## **7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo, prašiči

## **8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POTI IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA**

*Govedo:* Zdravilo dajemo intramuskularno ali subkutano v področje vratu. Intramuskularni odmerek je 20 mg/kg telesne mase (kar pomeni 1 ml/15 kg) dvakrat v razmiku 48 ur. Subkutano pa lahko zdravilo damo v enkratnem odmerku 40 mg/kg telesne mase (kar pomeni 2 ml/15 kg). Pri obeh načinih dajanja naj odmerek ne bo večji kot 10 ml na eno mesto dajanja.

*Prašiči:* Zdravilo dajemo intramuskularno v področje vratu. Odmerek je 15 mg/kg telesne mase (kar pomeni 1 ml/20 kg) dvakrat v razmiku 48 ur. Odmerek naj ne bo večji kot 10 ml na eno mesto dajanja.

## **9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA**

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

Raztopina je nežno rumeno do rumeno obarvana. Barva ne vpliva na učinkovitost zdravila.

## **10. KARENCA**

Meso in organi goved: 30 dni po intramuskularnem dajanju

44 dni po subkutanem dajanju

Ni dovoljena uporaba pri živalih v laktaciji, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Meso in organi prašičev: 14 dni

## **11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte v originalnem vsebniku pri temperaturi do 25 °C.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

## **12. POSEBNO(A) OPOZORILA**

Zdravila ne dajemo kravam v laktaciji.

Zdravila ne dajemo skupaj z zdravili, ki vsebujejo tiamfenikol ali kloramfenikol.

## **13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

## **14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO**

05.03.2013

## **15. DRUGE INFORMACIJE**

Stekleničke po 50 ml in 100 ml

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.