

1.3.1	Naproxen
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

## Navodilo za uporabo

### Naprosyn 500 mg gastrorezistentne tablete naproksen

**Pred začetkom jemanja zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite katere koli neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4.

#### Kaj vsebuje navodilo

1. Kaj je zdravilo Naprosyn in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Naprosyn
3. Kako jemati zdravilo Naprosyn
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Naprosyn
6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

#### 1. Kaj je zdravilo Naprosyn in za kaj ga uporabljamo

Zdravilo Naprosyn je namenjeno za lajšanje različnih bolečin in vnetja ter zniževanje povišane telesne temperature.

Deluje tako, da zavira tvorbo prostaglandinov.

Zdravilo Naprosyn vam zdravnik predpiše pri:

- vnetnih revmatskih boleznih (revmatoidni artritis, spondiloartritis, drugi artritis),
- degenerativnih revmatskih boleznih (artroza perifernih sklepov in hrbtenice),
- zunajsklepnih revmatskih boleznih (burzitis, periartritis, tendinitis, sindrom fibrozitisa),
- s kristali povzročenih artritid (protin, psevdoprotin),
- ginekoloških obolenjih (bolečine in menstruacijski krči, po porodu, če mati ne doji),
- drugih bolečinskih stanjih (pri poškodbah mehkih tkiv, pri zobobolu, po stomatoloških in drugih operacijah).

#### 2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Naprosyn

##### Ne jemljite zdravila Naprosyn

- če ste alergični na naproksen ali katero koli sestavino tega zdravila (navedeno v poglavju 6);
- če ste alergični na acetilsalicilno kislino in druga nesteroidna protivnetna zdravila (nesteroidni antirevmatiki) in ste po njihovi uporabi imeli težave z dihanjem (bronhialno astmo), koprivnico (urtikarijo), vneto nosno sluznico (alergični rinitis) ali preobčutljivostno reakcijo z nenadno oteklino ustnic ter obraza, vratu, lahko tudi rok in stopal, ali sta se pojavila dušenje in hripavost (angioedem);
- če imate rano na prebavilih ali druge bolezni prebavil;
- če ste bolnik s hudo jetrno ali ledvično okvaro;
- če imate hudo srčno popuščanje;
- če ste v tretjem trimesečju nosečnosti.

#### Opozorila in previdnostni ukrepi

PI_Text077475_3	30.07.2024 - Updated: 17.02.2026	Page 1 of 6
-----------------	----------------------------------	-------------

JAZMP-IB/021 - 20.02.2026

1.3.1	Naproxen
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Pred začetkom jemanja zdravila Naprosyn se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom:

- če imate ali ste v preteklosti imeli obolenja prebavil, vas mora zdravnik skrbno nadzorovati; posebna previdnost je potrebna pri ulceroznem kolitisu in Crohnovi bolezni, ker se bolezen lahko ponovi ali poslabša. Resni neželeni učinki v prebavilih lahko nastopijo brez kakršnihkoli predhodnih težav; možne so krvavitve in predrtje črevesne stene (perforacija črevesja);
- če se zdravite zaradi epilepsije ali imate sicer zelo redko presnovno motnjo krvnih barvil (porfirijo);
- če imate motnje v strjevanju krvi ali se sočasno zdravite z zdravili za preprečevanje strjevanja krvi (antikoagulanti, fibrinolitiki);
- pri velikih in svežih ranah ter pred načrtovanimi večjimi operacijskimi posegi;
- če ste bolnik z jetrno ali ledvično okvaro;
- če imate srčno popuščanje.

V povezavi z zdravilom so poročali o hudih kožnih reakcijah, vključno s Stevens Johnsonovim sindromom, toksično epidermalno nekrolizo, reakcijo na zdravilo z eozinofilijo in sistemskimi simptomi (DRESS). Prenehajte jemati in takoj poiščite zdravniško pomoč, če opazite katerega od simptomov, povezanih s temi hudimi kožnimi reakcijami, opisanimi v poglavju 4.

Po uporabi zdravila Naprosyn boste morda težje zanosili. Obvestite svojega zdravnika, če nameravate zanositi ali imate težave z zanositvijo.

### Otroci in mladostniki

Zdravila Naprosyn ne priporočamo pri mladostnikih, mlajših od 16 let.

Zdravila kot je Naprosyn so lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja srčne (miokardnega infarkta) ali možganske kapi. Večja verjetnost morebitnega tveganja je pri visokih odmerkih in podaljšanem zdravljenju. Ne prekoračite priporočenega odmerka ali trajanja zdravljenja.

Če imate težave s srcem, ste preboleli možgansko kap ali menite, da za vas obstaja morebitno tveganje za nastanek takih pogojev (visok krvni tlak, diabetes ali visok holesterol ali ste kadilec), se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Kot vsa zdravila, ki jih dajemo starejšim bolnikom, tudi naproksen priporočamo v najmanjših še učinkovitih odmerkih.

### Druga zdravila in zdravilo Naprosyn

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli jemati katero koli drugo zdravilo.

Pri sočasnem jemanju naproksena in nekaterih drugih zdravil lahko pride do medsebojnega delovanja, zato se lahko zmanjša ali poveča učinek enega ali drugega zdravila.

Posebej obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete:

- druga zdravila za lajšanje bolečine (acetilsalicilna kislina in druga nesteroidna protivnetna zdravila),
- zdravilo Nalgesin, ki vsebuje isto učinkovino naproksen,
- zdravila za preprečevanje strjevanja krvi (antikoagulanti, fibrinolitiki),
- zdravila, ki preprečujejo nastanek krvnih strdkov (acetilsalicilna kislina),
- zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni (sulfonilurea),
- zdravila za zdravljenje epilepsije (derivati hidantoina),
- zdravila za zdravljenje povečanega krvnega tlaka (zaviralci ACE),
- zdravila, ki povečujejo izločanje seča (furosemid),
- zdravila za zdravljenje psihičnih motenj (litij),
- zdravila za zdravljenje malignih obolenj (metotreksat),
- zdravila, ki pospešujejo izločanje sečne kisline iz telesa in preprečujejo napade protina (probenecid),
- zdravila, ki zavirajo imunski odziv (ciklosporin),

1.3.1	Naproxen
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

- zdravila za zdravljenje aidsa (zidovudin).

### Zdravilo Naprosyn skupaj s hrano, pijačo in alkoholom

Tablete pogoltnite cele, z nekaj tekočine. Lahko jih jemljete pred jedjo, med njo ali po njej. Zdravilo Naprosyn lahko ob sočasnem pitju alkohola poveča nevarnost želodčne krvavitve.

### Nosečnost in dojenje

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

#### Nosečnost:

Ne jemljite zdravila Naprosyn, če ste v zadnjih treh mesecih nosečnosti, saj lahko škoduje vašemu nerojenemu otroku ali povzroči težave pri porodu. Pri nerojenemu otroku lahko povzroči težave z ledvicami in srcem. Lahko vpliva na vašo in otrokovo nagnjenost h krvavitvam in povzroči, da bo porod potekal pozneje ali dlje, kot je pričakovano. V prvem in drugem trimesečju nosečnosti se zdravilo Naprosyn ne sme uporabljati, razen če je to nujno potrebno in vam ga je svetoval zdravnik. Če zdravilo Naprosyn uporablja ženska, ki poskuša zanositi, ali če ga uporablja v prvem ali drugem trimesečju nosečnosti, mora biti odmerek čim manjši, zdravljenje pa čim krajše. Od 20. tedna nosečnosti dalje lahko zdravilo Naprosyn, če ga jemljete več kot nekaj dni, pri nerojenem otroku povzroči težave z ledvicami, kar lahko privede do nizke ravni plodovnice, ki obdaja otroka (oligohidramnij), ali do zoženja krvne žile (arterioznega duktusa) v srcu otroka. Če boste zdravljenje potrebovali dlje kot nekaj dni, vam bo zdravnik morda priporočil dodatno spremljanje.

#### Dojenje:

Med zdravljenjem z zdravilom Naprosyn vam odsvetujemo dojenje.

### Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Naprosyn nima vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja strojev.

### Zdravilo Naprosyn vsebuje natrij

To zdravilo vsebuje manj kot 1 mmol (23 mg) natrija odmerek, kar v bistvu pomeni "brez natrija".

## 3. Kako jemati zdravilo Naprosyn

Pri jemanju tega zdravila natančno upoštevajte navodila zdravnika ali farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Običajni odmerek je 500 mg do 1000 mg na dan. Če dobro prenašate majhne odmerke in v preteklosti niste imeli obolenj prebavil, vam zdravnik lahko pri zelo hudih bolečinah dnevni odmerek poveča na 1500 mg, vendar najdlje za 2 tedna.

Indikacija	Dnevno odmerjanje tablete po 375 mg ali 500 mg	
	začetno zdravljenje	nadaljevalno zdravljenje
<b>Odrasli in mladostniki, stari 16 let in več</b>		
revmatoidni artritis, osteoartroza, spondilitis	500 mg do 1000 mg v 2 odmerkih	375 mg do 1000 mg v 1 do 2 odmerkih
akutni napad protina	začetni odmerek 750 mg, nato 375 mg vsakih 8 ur do prenehanja napada	
migrenski napadi - preprečevanje - zdravljenje	2 x 500 mg  pri prvem simptomu 750 mg, po	2 x 500 mg, če se stanje v 4 do 6 tednih ne izboljša, zdravljenje opustimo
PI_Text077475_3	30.07.2024 - Updated: 17.02.2026	Page 3 of 6

1.3.1	Naproxen
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

	potrebi še 375 mg do 500 mg, vendar ne prej kot čez pol ure	
lajšanje bolečin	prvi odmerek 375 mg do 750 mg, nato 3 x 375 mg	

### Če ste vzeli večji odmerek zdravila Naprosyn, kot bi smeli

Pri prevelikem odmerjanju se lahko pojavijo bolečine v trebuhu, slabost, bruhanje, omotica, šumenje v ušesih, razdražljivost, v hujših primerih tudi bruhanje krvi (hematemeza), kri v blatu (melena), motnje zavesti, motnje dihanja, krči in ledvična odpoved.

Če pride do znakov prevelikega odmerjanja, bo zdravnik ustrezno ukrepal.

### Če ste pozabili vzeti zdravilo Naprosyn

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Zdravilo vzemite vsak dan ob približno istem času. Če ste zdravilo pozabili vzeti ob predvideni uri, ga vzemite takoj, ko se spomnite.

### Če ste prenehali jemati zdravilo Naprosyn

Če naproksen uporabljate za kratkotrajno lajšanje bolečin, ga lahko varno prenehate uporabljati takoj, ko ga ne potrebujete več. Kadar zdravnik predpiše dolgotrajno zdravljenje, se morate z njim posvetovati, preden zdravilo opustite.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

## 4. Možni neželeni učinki

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Prenehajte jemati Naprosyn in se takoj posvetujte z zdravnikom, če opazite katerega koli od naslednjih neželenih učinkov (neznana pogostnost: pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):

- razširjen izpuščaj, visoka telesna temperatura, povišane vrednosti jetrnih encimov, anomalije krvi (eozinofilija), povečane bezgavke in vpletenost drugih telesnih organov (reakcija na zdravilo z eozinofilijo in sistemskimi simptomi, znana tudi kot DRESS). Glejte tudi poglavje 2.
- značilna kožna alergijska reakcija, znana kot z zdravili povzročena fiksna izpuščaj, ki se običajno pojavi na istem mestu(-ih) ob ponovni izpostavljenosti zdravilu in je lahko videti kot okrogle ali ovalne pordele in otekle zaplate kože z mehurji (koprivnica) in srbenjem.

Neželeni učinki so najpogosteje povezani z večjimi odmerki.

*Pogosti (pojavi se lahko pri največ 1 od 10 bolnikov):*

- zaprtje, bolečine v trebuhu, slabost, dispepsija, driska, vnetje ustne sluznice (stomatitis)
- glavobol, vrtoglavica, omotičnost, zaspanost
- srbenje, kožni izpuščaji, krvavitev v koži ali sluznici (ekhimioza), rdečkasto obarvane drobne lise in pike na koži, ki nastanejo zaradi majhnih krvavitev v koži ali podkožju (purpura)
- šumenje v ušesih (tinitus), motnje sluha
- motnje vida
- edemi, hitro ali močno utripanje srca (palpitacije)
- žeja, znojenje
- oteženo dihanje (dispneja)

*Občasni (pojavi se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov):*

- krvavitev iz prebavil in/ali perforacija želodca, bruhanje krvi iz želodca ali požiralnika (hematemeza), kri v blatu (melena), bruhanje

1.3.1	Naproxen
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

- povečano delovanje jetrnih encimov, zlatenica
- depresija, nenormalne sanje, nesposobnost koncentracije, nespečnost, občutek slabosti
- bolečine v mišicah in mišična slabost
- izpadanje las (alopecija), fotosenzitivni dermatitis
- okvare sluha
- kongestivno srčno popuščanje (zdravila, kot je Naprosyn, so lahko povezana z majhnim povečanjem tveganja srčne (miokardnega infarkta) ali možganske kapi)
- preobčutljivostne reakcije
- pireksija - mrzlica, vročica
- motnje menstruacije
- motnje v ledvičnem delovanju (glomerulni nefritis, hematurija, intersticijski nefritis, nefrotični sindrom, zmanjšanje delovanja ledvic, ledvična odpoved, ledvična papilarna nekroza)
- spremembe krvne slike (eozinofilija, granulocitopenija, levkopenija, trombocitopenija)
- pljučnica (eozinofilni pneumonitis)

*Neznana pogostnost (pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti):*

- mehurjaste reakcije na koži (vključno s Stevens-Johnsonovim sindromom in toksično epidermalno nekrolizo)

Neželeni učinki, pri katerih vzročna povezava z jemanjem naproksena ni znana:

- spremembe krvne slike (aplastična anemija, hemolitična anemija)
- vnetje ovojnic osrednjega živčevja (aseptični meningitis), psihične (kognitivne) motnje
- kožne preobčutljivostne reakcije (multiformni eritem, fotosenzitivne reakcije, podobne kožni porfiriji tardi in bulozni epidermolizi, urtikarija)
- vnetje ustne sluznice z razjedami sluznice (ulcerozni stomatitis)
- vnetje krvne žile (vaskulitis)
- preobčutljivostne reakcije (angionevrotični edem), povečana koncentracija glukoze v krvi (hiperglikemija), zmanjšana koncentracija glukoze v krvi (hipoglikemija)

### **Poročanje o neželenih učinkih**

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih lahko poročate tudi neposredno na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke  
 Sektor za farmakovigilanco  
 Nacionalni center za farmakovigilanco  
 Slovenčeva ulica 22  
 SI-1000 Ljubljana  
 Tel: +386 (0)8 2000 500  
 Faks: +386 (0)8 2000 510  
 e-pošta: [h-farmakovigilanca@jazmp.si](mailto:h-farmakovigilanca@jazmp.si)  
 spletna stran: [www.jazmp.si](http://www.jazmp.si)

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega zdravila.

## **5. Shranjevanje zdravila Naprosyn**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca.

1.3.1	Naproxen
SPC, Labeling and Package Leaflet	SI-Slovenia

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje.

## 6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije

### Kaj vsebuje zdravilo Naprosyn

- Učinkovina je naproksen. Ena gastrorezistentna tableta vsebuje 500 mg naproksena.
- Druge sestavine zdravila so premreženi natrijev karmelozat, povidon in magnezijev stearat v jedru tablete ter kopolimer 1:1 metakrilne kisline in etilakrilata, smukec in trietilcitrat v oblogi. Glejte poglavje 2 "Zdravilo Naprosyn vsebuje natrij".

### Izgled zdravila Naprosyn in vsebina pakiranja

Gastrorezistentne tablete so bele barve, ovalne.

Na voljo so škatle:

- z 20 (2 x 10) gastrorezistentnimi tabletami v pretisnih omotih,
- s 30 (3 x 10) gastrorezistentnimi tabletami v pretisnih omotih,
- s 60 (6 x 10) gastrorezistentnimi tabletami v pretisnih omotih.

### Način in režim izdaje zdravila Naprosyn

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec

KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 2. 2026.