NAVODILO ZA UPORABO

1. Ime zdravila za uporabo v veterinarski medicini

Trisulfon peroralni prašek za teleta, kozličke, jagnjeta, prašiče, piščance in kunce

2. Sestava

100 g peroralnega praška vsebuje:

Učinkovini:

natrijev sulfamonometoksinat monohidrata)	4,31 g (kar ustreza 4,57 g natrijevega sulfamonometoksinat
trimetoprim	2,0 g

Sipek prašek brez vonja.

3. Ciljne živalske vrste



Teleta, kozlički, jagnjeta, prašiči, piščanci in kunci.

4. Indikacije

Zdravljenje obolenj pri živalih, ki jih povzročajo mikroorganizmi, občutljivi za trimetoprim in sulfamonometoksin: obolenja dihal, prebavil in sečil, sekundarne in specifične infekcijske bolezni:
Teleta, kozlički, jagnjeta: driske, koliseptikemije, streptokokni poliartritisi, salmoneloze, pastereloza, pljučnice, stafilokokni abscesi, omfalitisi.
Prašiči: kolibaciloza, kokcidioza, atrofični rinitis, salmoneloze, hemofilusne infekcije, pastereloza, toksoplazmoze.
Piščanci: kokcidioza, koliseptikemija, pastereloza, salmoneloze, stafilokokoza, kužna korica.
Kunci: kokcidioza, pastereloza, stafilokokoza, kolibaciloza, salmoneloza.

5. Kontraindikacije

Ne uporabite v primeru okvare delovanja ledvic.

6. Posebna opozorila

Posebni previdnostni ukrepi za varno uporabo pri ciljnih živalskih vrstah:
Živali naj imajo med zdravljenjem na voljo dovolj pitne vode.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:
Osebe z znano preobčutljivostjo na natrijev sulfamonometoksinat ali trimetoprim naj se izogibajo stiku z zdravilom.
Po uporabi zdravila si umijte roke.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Nekatera zdravila, kot so fenilbutazon, salicilati in indometacin pri vezavi na beljakovine v krvni plazmi izpodrivajo sulfonamide in tako povečujejo njihovo učinkovitost in toksičnost. Derivati paraaminobenzojske kisline (PABA), kot so lokalni anestetiki prokain, terakain ter prokainamid, pa zmanjšujejo učinkovitost protimikrobnega delovanja sulfonamidov, ker dvigujejo nivo paraaminobenzojske kisline v organizmu.

Glavne inkompatibilnosti:
Informacije o morebitnem medsebojnem delovanju ali inkompatibilnostih ob peroralnem dajanju tega zdravila, z mešanjem v vodo za pitje, ki vsebuje biocidne izdelke, krmne dodatke ali druge učinkovine v vodi za pitje niso na voljo.

Brejost in laktacija:
Varnost zdravila v obdobju brejosti in laktacije ni bila ugotovljena.
Uporabite le v skladu z oceno razmerja korist-tveganje odgovornega veterinarja.

Ptice v obdobju nesnosti:
Ne uporabite pri pticah, ki proizvajajo ali so namenjene proizvodnji jajc za prehrano ljudi.

7. Neželeni dogodki

Niso znani.

Poročanje o neželenih dogodkih je pomembno, saj omogoča stalno spremljanje varnosti zdravila. Če opazite kakršne koli neželene učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo, ali mislite, da zdravilo ni delovalo, se najprej obrnite na svojega veterinarja. O vseh neželenih dogodkih lahko poročate tudi imetniku dovoljenja za promet z zdravilom, pri čemer uporabite kontaktne podatke na koncu tega navodila za uporabo, ali preko nacionalnega sistema za poročanje:
https://www.jazmp.si/spletni-obrazec/

8. Odmerki za posamezno živalsko vrsto, poti in način uporabe zdravila

Peroralna uporaba.

Teleta, jagnjeta, kozlički in prašiči: dnevni odmerek za je 10 g zdravila na 40 kg telesne mase. Zdravilo dajte enkrat na dan, 5 dni zapored v vodi za pitje ali v krmi.

Piščanci: odmerek za zdravljenje kokcidioze je 800 g zdravila na 100 l vode za pitje, za 3 do 5 dni. Za zdravljenje ostalih bolezni je dnevni odmerek 200 g zdravila na 100 l vode za pitje.

Kunci: 8 g zdravila na 1 l vode za pitje.

9. Nasvet o pravilni uporabi zdravila

Da bi zagotovili pravilen odmerek, je treba čim bolj natančno določiti telesno maso živali.

To zdravilo se lahko daje samo živalim, ki se krmijo posamično, ali majhnim skupinam živali, pri čemer je mogoče učinkovito nadzorovati vnos zdravila pri posamezni živali.

10. Karenca

Teleta: Meso in organi: 10 dni.
Kozlički: Meso in organi: 10 dni.

Jagnjeta: Meso in organi: 10 dni.
Prašiči : Meso in organi: 10 dni.
Kunci: Meso in organi: 10 dni.
Piščanci: Meso in organi: 10 dni.

Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Ni za uporabo pri pticah, ki proizvajajo ali so namenjene proizvodnji jajc za prehrano ljudi.

11. Posebna navodila za shranjevanje

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.
Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo in vlago.

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini po Exp. Rok uporabnosti zdravila se nanaša na zadnji dan v navedenem mesecu.

Vreče po 20 g, 100g in 1kg: Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 30 dni.

12. Posebni varnostni ukrepi za odstranjevanje

Ne odvrzite zdravila v odpadno vodo ali med gospodinjske odpadke.

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo pri uporabi tega zdravila, je treba odstraniti po sistemu vračanja zdravil v skladu z lokalnimi zahtevami oziroma morebitnimi nacionalnimi sistemi zbiranja, ki se uporabljajo za zadevno zdravilo.
Ti ukrepi pomagajo varovati okolje.

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem ali farmacevtom.

13. Razvrstitev zdravil za uporabo v veterinarski medicini

Na veterinarski recept.

14. Številka dovoljenja za promet in velikosti pakiranj

NP/V/0340/002

Lončki po 100 g, vreče po 20 g, 100 g in 1 kg peroralnega praška.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

15. Datum zadnje revizije besedila navodila za uporabo

15.10.2026

Podrobne informacije o tem zdravilu so na voljo v zbirki podatkov Unije o zdravilih (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).

16. Kontaktni podatki

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij ter kontaktni podatki za sporočanje domnevnih neželenih dogodkov:
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija
Tel: 00386 (0) 51 635 877