

NAVODILO ZA UPORABO

FLORON 100 mg/ml peroralna raztopina za perutnino in prašiče

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

KRKA, tovarna zdravil, d. d. Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

FLORON 100 mg/ml peroralna raztopina za perutnino in prašiče
Florfenikol

3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

Florfenikol100 mg/ml

4. INDIKACIJE

Perutnina: koliinfekcije, pasterelozne infekcije, kužna korica, stafilokokne infekcije, infekcije z *Ornitobacterium rhinotracheale* in ostale bolezni, ki jih povzročajo za florfenikol občutljivi mikroorganizmi.

Prašiči: plevropnevmonija (*Actinobacillus pleuropneumoniae*), atrofični rinitis (*Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*), Glässerjeva bolezen (*Haemophilus parasuis*) in ostale bolezni, ki jih povzročajo za florfenikol občutljivi mikroorganizmi.

5. KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

6. NEŽELENI UČINKI

Pri perutnini niso znani.

Pri prašičih se lahko pojavi pordelost perianalnega področja in mehko blato. Spremembe so prehodne in kratkotrajne ter ne vplivajo na splošno počutje živali.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Perutnina, prašiči

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Perutnina: Dnevni odmerek je 20 mg florfenikola na kg telesne mase, kar znaša 100 ml zdravila na 100 l vode za pitje za piščance do 4. tedna starosti, za kategorije po 4. tednu starosti pa 200 ml zdravila na 100 l vode za pitje. Zdravljenje traja 3 do 5 dni.

Prašiči: Dnevni odmerek je 10 mg florfenikola na kg telesne mase, kar pomeni pri 100 kg težkem prašiču 10 ml zdravila na dan. Zdravljenje traja 5 dni.

Piščancem in prašičem dajemo zdravilo v vodi za pitje. Med zdravljenjem dajemo živalim le pitno vodo z zdravilom. Kadar to ni mogoče, dnevni odmerek razdelimo na dva enaka dela in dajemo en del kot jutranji odmerek, drugega pa čez 12 ur.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili.

Zdravila ne smemo uporabljati sočasno s tiamfenikolom ali kloramfenikolom.

10. KARENCA

Meso in organi piščancev: 2 dni.

Ni dovoljena uporaba pri pticah v obdobju nesnosti, katerih jajca so namenjena prehrani ljudi.

Meso in organi prašičev: 20 dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte v originalnem pakiranju pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

12. POSEBNA OPOZORILA

Kadar pri vmešavanju zdravila v pitno vodo presežemo koncentracijo 1 g florfenikola na liter vode, pride do obarjanja oz. izločanja učinkovine.

Perutnina: Ni dovoljena uporaba pri pticah v obdobju nesnosti, katerih jajca so namenjena prehrani ljudi.

Prašiči: Ne uporabite v obdobju brejosti in laktacije pri svinjah. Ne uporabite pri odraslih merjascih, ki so namenjeni za reprodukcijo.

Pri večji porabi vode zaradi višjih temperatur zraka v hlevu je treba koncentracijo zdravila v vodi za pitje zmanjšati za 25 % oziroma jo prilagoditi dnevni porabi in odmerjanju na kg telesne mase.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODIL ZA UPORABO

30.3.2012

15. DRUGE INFORMACIJE

Stekleničke po 100 ml in plastenke po 1 l z odmernim pripomočkom.
Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.